



Istruzione Operativa Aziendale Tecnica Igiene e Organizzazione Ospedaliera	IAT IOO 06
Precauzioni per malattie trasmesse attraverso droplets (particelle con diametro maggiore di 5 micron)	Rev. 1 del 29.05.2015 Pagina 1 di 2

ITER EMISSIONE	E. O.	NOME COGNOME	FIRMA
REDAZIONE	Servizio Sorveglianza Sanitaria	Dott. A. Cagliari	
	MdA Servizio Igiene Ospedaliera	Sig.ra M.C. Caldana	
	Servizio Sorveglianza Sanitaria	Dr.ssa D. Olivato	
	MdA Servizio Igiene Ospedaliera	Sig.ra P. Soffiatti	
	Servizio Prevenzione e Protezione	Dr. S. Zancarli	
	MdA Servizio Igiene Ospedaliera	Sig. M. Zanoni	
VERIFICA	Servizio per le Professioni Sanitarie	Dr.ssa E. Allegrini	
	Servizio Miglioramento Qualità e Accreditamento	Dr.ssa F. Fabris	
	Servizio Sorveglianza Sanitaria	Dr. B. Lonardi	
	Servizio Prevenzione e Protezione	Ing. M. Lorenzi	
	Direzione Medica Ospedaliera	Dr. M. Somavilla	
APPROVAZIONE	Direzione Medica Ospedaliera	Dr.ssa G. Ghirlanda	
DATI GESTIONE DOCUMENTO			
NOME FILE	IAT IOO 06 - rev 1 - 29.05.2015.doc		
DATA PRIMA APPLICAZIONE	15.12.2010		
DISTRIBUZIONE	Controllata <input type="checkbox"/> Non Controllata <input checked="" type="checkbox"/>		



Premessa

I droplets, goccioline di escreato con diametro \geq ai 5 micron, sono generati dalla persona principalmente durante la tosse, lo starnuto, nel parlare e nel corso di procedure come l'aspirazione e la broncoscopia. **I droplets si propagano a breve distanza dalla persona infetta.**

Campo di applicazione

Adottare le precauzioni per malattie trasmesse da goccioline / droplets in caso di: Meningite batterica, polmonite, epiglottite e sepsi causate da Haemophilus influenzae tipo b invasivo; meningite, polmonite e sepsi causate da Neisseria meningitidis invasiva; meningite, polmonite, sinusite e otite media causate da Streptococcus pneumoniae multiresistenti ai farmaci; infezioni respiratorie quali la difterite laringea, polmonite da micoplasma, pertosse, peste polmonare, faringite da Streptococco beta-emolitico di gruppo A, polmonite o sindrome febbrile in neonati e bambini piccoli; infezioni virali quali influenza, parotite, rosolia e quelle sostenute da adenovirus.

Misure da adottare

ISOLAMENTO	- porre il paziente in camera singola (eventualmente sistemare con isolamento a coorte ¹); in alternativa assicurare la separazione spaziale di almeno 1 metro rispetto agli altri pazienti e ai visitatori
MASCHERINA	- indossare il facciale filtrante FFP2 o FFP3 se ci si avvicina a meno di un metro dal paziente; per le indicazioni e le modalità d'uso delle maschere vedere IAT I.O.O. 12 "Utilizzo del facciale filtrante FFP2/FFP3"
TRASPORTO	- limitare il trasporto del paziente ed eventualmente fargli usare la mascherina chirurgica
SOVRACAMICI	- è consigliato l'uso dei sovracamici quando si prevede il contatto diretto con i pazienti

Utilizzare queste precauzioni, in aggiunta alle Precauzioni Standard

¹ Più pazienti con la stessa patologia infettiva ricoverati nella stessa stanza