



Istruzione Operativa Aziendale Tecnica Igiene e Organizzazione Ospedaliera	IAT IOO 07
Precauzioni per malattie trasmesse attraverso la via aerea (malattie che si trasmettono attraverso particelle inferiori a 5 micron)	Rev. 1 del 29.05.2015 Pagina 1 di 2

ITER EMISSIONE	E. O.	NOME COGNOME	FIRMA
REDAZIONE	Servizio Sorveglianza Sanitaria	Dott. A. Cagliari	
	MdA Servizio Igiene Ospedaliera	Sig.ra M.C. Caldana	
	Malattie Infettive e Tropicali	Prof. A. Cazzadori	
	Malattie Infettive e Tropicali	Dr. M. Conti	
	Microbiologia e Virologia	Dr. F. Favari	
	Microbiologia e Virologia	Dr. G. Lo Cascio	
	Malattie Infettive e Tropicali	Dr.ssa M. Merighi	
	Servizio Sorveglianza Sanitaria	Dr.ssa D. Olivato	
	MdA Servizio Igiene Ospedaliera	Sig.ra P. Soffiatti	
	Malattie Infettive e Tropicali	Dr. F. Soldani	
	Servizio Prevenzione e Protezione	Dr. S. Zancarli	
	MdA Servizio Igiene Ospedaliera	Sig. M. Zanoni	
VERIFICA	Servizio per le Professioni Sanitarie	Dr.ssa E. Allegrini	
	Direzione Medica Ospedaliera	Dr. F. Bercelli	
	Malattie Infettive e Tropicali	Prof. E. Concia	
	Microbiologia e Virologia	Prof. G. Cornaglia	
	Servizio Miglioramento Qualità e Accreditamento	Dr.ssa F. Fabris	
	Servizio Sorveglianza Sanitaria	Dr. B. Lonardi	
	Servizio Prevenzione e Protezione	Ing. M. Lorenzi	
	Direzione Medica Ospedaliera	Dr. M. Somavilla	
APPROVAZIONE	Direzione Medica Ospedaliera	Dr.ssa G. Ghirlanda	
DATI GESTIONE DOCUMENTO			
NOME FILE	IAT IOO 07 - rev 1 - 29.05.2015.doc		
DATA PRIMA APPLICAZIONE	15.12.2010		
DISTRIBUZIONE	Controllata <input type="checkbox"/> Non Controllata <input checked="" type="checkbox"/>		



Premessa

La trasmissione per via aerea si verifica attraverso la disseminazione di **piccole particelle con un diametro inferiore ai 5 micron** oppure di particelle di polveri contenenti l'agente infettivo; queste **rimangono sospese nell'aria per un lungo periodo**.

Campo di applicazione

Adottare le precauzioni per malattie trasmesse per via aerea in caso di: morbillo, varicella, zoster disseminato, **tubercolosi**

Misure da adottare

ISOLAMENTO	<ul style="list-style-type: none">- porre il paziente in camera singola (eventualmente sistemare con isolamento a coorte¹) <u>se possibile</u> con almeno 6 ricambi d'aria l'ora e in pressione negativa- <u>se possibile</u> FAR INDOSSARE al paziente una MASCHERA CHIRURGICA con copertura di naso e bocca- tenere la porta della stanza chiusa
MASCHERA FACCIALE FILTRANTE	<ul style="list-style-type: none">- indossare protezioni respiratorie (maschera FFP2 o FFP3 secondo le indicazioni e le modalità d'uso indicate nella IAT I.O.O. 12 "Utilizzo del facciale filtrante FFP2/FFP3" quando si entra nella stanza con paziente con TBC attiva sospetta o accertata;- personale recettivo non deve entrare nelle camere di pazienti con varicella o morbillo senza usare la maschera
TRASPORTO	<ul style="list-style-type: none">- limitare il trasporto del paziente ed eventualmente fargli indossare la maschera chirurgica- indossare le protezioni respiratorie in caso di stazionamento in ambiente confinato e/o scarsamente ventilato (es. ascensore)- quando possibile in ascensore evitare l'affollamento
SOVRACAMICI	<ul style="list-style-type: none">- è consigliato l'uso dei sovracamici quando si prevede il contatto diretto con i pazienti

Utilizzare queste precauzioni, in aggiunta alle Precauzioni Standard

¹ più pazienti con la stessa patologia infettiva ricoverati nella stessa stanza