



Ministero della Salute



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali



AGENAS

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali



Programma Nazionale Esiti
Edizione 2025

Report sui dati 2024

Dati relativi all'anno 2024 pubblicati da AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Download dal sito <http://pne.agenas.it/>

INDICATORE: PROCESSO, ESITO

AOUI di VERONA Ospedale di BORGO TRENTO (Vr) VENETO							
Indicatore	N	% Grezza	% Adj	RR	p	RR Prec.	p Prec.
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	28	3,57	3,37	0,73	0,759		
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	34	17,65	17,98	1,5	0,339	1,01	0,986
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	28	28,57	27,86	1,71	0,082	0,66	0,439
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	147	12,25	11,84	1,3	0,271	1,39	0,362
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	134	9,7	9,47	0,81	0,42	0,78	0,481
Bypass aorto-coronarico isolato: mortalità a 30 giorni - con nuove variabili	329	1,22	1,4	0,93	0,879	0,51	0,564
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	271	2,58	2,32	2,04	0,058	1,2	0,81
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	271	13,65	12,88	6,79	0	1,51	0,197
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	121	86,78	90,21	1,05	0,004	1,01	0,661
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri ORDINARI con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	121	86,78	89,89	1,05	0,005	1,01	0,661
Embolia polmonare: mortalità a 30 giorni dal ricovero	99	5,05	5,62	0,61	0,262	0,59	0,337
Embolia polmonare: riammissioni a 30 giorni dal ricovero	94	7,45	8,23	0,97	0,94	1,57	0,426



Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore dall'accesso nella struttura di ricovero	392	63,27	64,67	1,07	0,075	1,2	0,002
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	355	7,04	5,92	1,27	0,256	1,06	0,842
Ictus ischemico: mortalità a 1 anno	416	10,82	12,28	0,8	0,161	0,87	0,515
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	409	7,58	7,94	0,87	0,435	0,98	0,94
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	386	3,89	3,89	0,57	0,025	0,65	0,18
IMA NSTEMI: mortalità a 1 anno	167	4,79	5,01	0,55	0,108	0,56	0,232
IMA STEMI: mortalità a 1 anno	139	4,32	4,19	0,71	0,426	1,77	0,392
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni - con nuove variabili	343	5,83	6,5	0,96	0,921	0,99	0,963
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	346	4,05	4,03	0,49	0,012	0,63	0,263
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	268	2,61	3,92	0,54	0,107	0,47	0,12
Intervento chirurgico di resezione pancreatico per TM: mortalità a 90 giorni	3	0					
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	194	1,03	1,12	0,32	0,112		
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	64	1,56	1,55	0,81	0,833		
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	317	53,31				1	0,996
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	197	0,51	0,61	0,72	0,747		
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 90 giorni	177	0,57	0,57	0,27	0,185		
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	159	1,89	1,91	0,53	0,267	0,46	0,271
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni - con nuove variabili	159	1,89	1,92	0,53	0,272	0,47	0,278
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	310	0					
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	71	0					
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	268	1,49	2,04	0,4	0,073		
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 90 giorni	249	3,21	4,04	0,42	0,014	1	0,997
Intervento chirurgico per tumore cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	863	1,97	3,36	1,22	0,413	0,59	0,343
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	43	6,98	6,48	2,26	0,151	2,64	0,397
Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	4	0					
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	126	0					
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	156	0					
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	182	6,04	4,43	1,38	0,308	1,46	0,442
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	100	1	0,96	0,33	0,271		



Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	93	1,08	0,85	0,75	0,778	1,11	0,942
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	51	0					
Mortalità a 1 anno nei sopravvissuti a 30 giorni da Infarto Miocardico Acuto complicato da scompenso cardiaco	33	18,18					
Mortalità a 30 giorni per IMA NSTEMI	165	3,64	3,47	0,81	0,605	0,66	0,44
Parto con taglio cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	990	2,12	2,01	1,93	0,003	0,64	0,313
Parto vaginale: ricoveri successivi durante il puerperio	2366	0,93	0,89	1,45	0,081	1,66	0,25
Proporzione di colecistectomie laparoscopiche eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui (UO coerente)	321	90,97				1	0,891
Proporzione di colecistectomie laparoscopiche in pazienti con colelitiasi in day surgery/one day surgery	87	78,16	79,69	2,03	0	0,98	0,774
Proporzione di episiotomie nei parti vaginali	1389	5,54	5,17	0,57	0	0,95	0,77
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	91	83,52	82,22	1,17	0	1,01	0,827
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella - con nuove variabili	85	83,53	82,16	1,17	0	1,01	0,875
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui (UO coerente)	317	99,69				1	0,619
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	132	3,79	3,68	0,73	0,471	0,68	0,569
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	139	1,44	1,38	0,3	0,086	0,2	0,135
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	1802	21,25	17,13	0,77	0	0,86	0,103
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo	245	20,41	18,17	1,54	0,002	1,46	0,09
Proporzione di PTCA in STEMI su totale PTCA	424	43,87				1,29	0,004
Proporzione pazienti con interessamento linfonodale riscontrato durante ricovero per intervento TM mammella	251	21,51				0,87	0,367
Proporzione pazienti sottoposte a ricerca linfonodo sentinella durante ricovero per intervento TM mammella	251	68,53				0,93	0,183
Proporzione pazienti sottoposte a svuotamento ascellare durante ricovero per intervento TM mammella	251	17,13				0,99	0,94
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	90	1,11	1,22	0,83	0,854		
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	296	10,14	9,47	1,01	0,964	1,26	0,409
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	240	7,5	7,4	0,62	0,038	0,58	0,064
STEMI: Mortalità a 30 giorni	168	8,33	9,95	1,16	0,585	1,41	0,402



STEMI: proporzione di PTCA entro 90 minuti sul totale dei trattati con PTCA entro 12h dall'accesso nella struttura di ricovero/service	173	87,86	87,59	1,15	0	0,97	0,524
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti dall'accesso nella struttura di ricovero/service	190	80	79,22	1,38	0	1,1	0,131
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	920	1,09	1,15	0,56	0,064	4,12	0,073

AOUI di VERONA Ospedale di BORGO ROMA (Vr) VENETO							
Indicatore	N	% Grezza	% Adj	RR	p	RR Prec.	p Prec.
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	6	0					
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	7	14,29					
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	6	16,67					
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	63	9,52	9,39	1,03	0,947	1,6	0,437
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	57	10,53	10,13	0,86	0,705	0,8	0,647
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	259	1,54	1,59	1,4	0,499	6,57	0,102
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	260	1,15	1,16	0,61	0,395	4,71	0,205
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	103	84,47	85,41	0,99	0,867	1	0,962
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri ORDINARI con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	103	84,47	84,98	1	0,89	1	0,969
Embolia polmonare: mortalità a 30 giorni dal ricovero	40	15					
Embolia polmonare: riammissioni a 30 giorni dal ricovero	34	17,65					
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore dall'accesso nella struttura di ricovero	2	50					
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	2	0					
Ictus ischemico: mortalità a 1 anno	77	12,99	10,32	0,68	0,249	1,03	0,95
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	76	5,26	4,95	0,54	0,229	1,35	0,699
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	73	1,37	1,46	0,21	0,119	0,18	0,11
IMA NSTEMI: mortalità a 1 anno	12	8,33					
IMA STEMI: mortalità a 1 anno	4	25					
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni - con nuove variabili	11	9,09					
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	20	15					



Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	19	5,26					
Intervento chirurgico di resezione pancreatica per TM: mortalità a 90 giorni	808	2,1	2,7	0,33	0	0,77	0,632
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	97	2,06	1,83	0,52	0,375		
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	273	0					
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	1	0					
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 90 giorni	1	0					
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	7	0					
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	26	0					
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	20	0					
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 90 giorni	19	0					
Intervento chirurgico per tumore cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	5	0					
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	3	0					
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	3	33,33					
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	1	0					
Mortalità a 1 anno nei sopravvissuti a 30 giorni da Infarto Miocardico Acuto complicato da scompenso cardiaco	4	0					
Mortalità a 30 giorni per IMA NSTEMI	9	0					
Proporzione di colecistectomie laparoscopiche eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui (UO coerente)	311	87,14				1,01	0,668
Proporzione di colecistectomie laparoscopiche in pazienti con colelitiasi in day surgery/one day surgery	82	48,78	44,75	1,14	0,293	1,24	0,214
Proporzione di PTCA in STEMI su totale PTCA	5	0					
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	1	0					
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	123	7,32	5,73	0,61	0,139	1,13	0,778
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	100	11	11,04	0,93	0,801	0,77	0,448
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	3	0					