



Programma Nazionale Esiti

PNE 2024



Dati relativi all'anno 2023 pubblicati da AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Download dal sito <http://pne.agenas.it/>

INDICATORE: PROCESSO, ESITO

AOUI di VERONA Ospedale di BORGO TRENTO (Vr) VENETO					
INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	28	7,14	6,93	1,59	0,513
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	32	12,5	10,62	0,82	0,708
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	28	21,43	22,77	1,34	0,416
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	136	8,82	7,93	0,83	0,521
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	127	11,81	11,71	0,96	0,86
Bypass aorto-coronarico isolato: mortalità a 30 giorni	363	1,38	1,93	1,07	0,876
Bypass aorto-coronarico isolato: mortalità a 30 giorni - con nuove variabili	363	1,38	2,11	1,17	0,734
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	318	1,57	1,34	1,19	0,702
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	318	11,01	9,69	5,01	0
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	159	83,65	87,84	1,04	0,11
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	159	55,35	64,91	2,04	0
Embolia polmonare: mortalità a 30 giorni dal ricovero	86	9,3	9,37	0,95	0,876
Embolia polmonare: riammissioni a 30 giorni dal ricovero	81	4,94	5,29	0,59	0,281
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni dall'accesso nella struttura di ricovero	406	68,97	69,9	0,99	0,747
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore dall'accesso nella struttura di ricovero	406	53,2	54,03	0,96	0,379
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	373	5,9	5,12	1,02	0,935
Ictus ischemico: mortalità a 1 anno	425	12	13,76	0,86	0,296



AOUI di VERONA Ospedale di BORGO TRENTO (Vr) VENETO					
INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	418	8,13	8,36	0,89	0,506
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	388	5,41	5,41	0,8	0,288
IMA NSTEMI: mortalità a 1 anno	149	8,73	8,65	0,89	0,706
IMA STEMI: mortalità a 1 anno	176	2,27	2,59	0,43	0,099
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	337	8,01	6,17	0,87	0,588
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni - con nuove variabili	337	8,01	5,52	0,77	0,366
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	321	7,79	5,74	0,89	0,6
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	367	6	6,12	0,71	0,235
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	432	7,18	7,99	0,7	0,048
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	178	1,69	1,97	0,53	0,29
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	55	0			
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	349	53,3			
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	5	0			
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 90 giorni	5	20			
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	187	0			
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 90 giorni	176	1,14	1,21	0,52	0,358
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	136	4,41	4,41	1,19	0,657
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni - con nuove variabili	136	4,41	3,96	1,07	0,997
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	238	0,42	0,38	0,53	0,526
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	70	0			
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	260	1,54	2,23	0,42	0,962
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 90 giorni	237	2,53	3,17	0,31	0,004
Intervento chirurgico per tumore cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	876	1,6	2,73	0,92	0,753
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	41	2,44	2,79	1,05	0,961
Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	10	0			
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	228	0,44	0,42	0,51	0,497
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	140	2,14	2,09	1	0,994
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	156	3,85	2,59	0,83	0,653
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	71	0			
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	97	1,03	0,84	0,76	0,779
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	57	0			
Mortalità a 1 anno nei sopravvissuti a 30 giorni da Infarto Miocardico Acuto complicato da scompenso cardiaco	51	15,69	13,43	0,72	0,376
Mortalità a 30 giorni per IMA NSTEMI	159	4,4	4,32	0,96	0,909
Parto con taglio cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	1192	2,94	2,92	3,16	0
Parto vaginale: ricoveri successivi durante il puerperio	2714	0,63	0,61	1,13	0,618



AOUI di VERONA Ospedale di BORGO TRENTO (Vr) VENETO						
INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P	
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui (UO coerente)	323	90,71				
Proporzione di episiotomie nei parti vaginali	1105	5,7	5,42	0,52	0	
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	116	63,79	68,43	1,28	0,001	
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella - con nuove variabili	116	63,79	69,49	1,3	0,001	
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui (UO coerente)	349	99,43				
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	167	5,99	6,46	1,15	0,659	
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - con nuove variabili	167	5,99	5,62	1	0,989	
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	160	6,88	7,39	1,43	0,221	
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - con nuove variabili	160	6,88	6,28	1,22	0,512	
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	1451	22,26	18,72	0,83	0,003	
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo	216	13,89	12,96	1,12	0,532	
Proporzione di PTCA in STEMI su totale PTCA	400	34				
Proporzione pazienti con interessamento linfonodale riscontrato durante ricovero per intervento TM mammella	282	24,82				
Proporzione pazienti sottoposte a ricerca linfonodo sentinella durante ricovero per intervento TM mammella	282	73,76				
Proporzione pazienti sottoposte a svuotamento ascellare durante ricovero per intervento TM mammella	282	17,38				
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	131	0,76	0,83	0,56	0,556	
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	258	6,59	6,79	0,7	0,15	
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	220	13,64	13,06	1,02	0,933	
STEMI: Mortalità a 30 giorni	125	8,8	7,22	0,81	0,513	
STEMI: proporzione di PTCA entro 90 minuti sul totale dei trattati con PTCA entro 12h dall'accesso nella struttura di ricovero/service	118	89,83	89,61	1,19	0	
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti dall'accesso nella struttura di ricovero/service	150	70,67	71,27	1,27	0	
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	966	1,04	1,06	0,48	0,02	



AOUI di VERONA Ospedale di BORGO ROMA (Vr) VENETO					
INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero		1	0		
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero		1	0		
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero		1	0		
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	69	7,25	6,35	0,67	0,363
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	66	15,15	13,61	1,11	0,723
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	340	0,88	0,81	0,72	0,572
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	341	1,76	1,58	0,82	0,622
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	164	81,71	83,72	0,99	0,697
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	165	31,52	28,86	0,91	0,448
Embolia polmonare: mortalità a 30 giorni dal ricovero	30	6,67			
Embolia polmonare: riammissioni a 30 giorni dal ricovero	28	14,29			
Ictus ischemico: mortalità a 1 anno	75	14,67	9,81	0,61	0,125
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	73	1,37	1,22	0,13	0,043
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	72	6,94	7,1	1,05	0,917
IMA NSTEMI: mortalità a 1 anno	13	23,08			
IMA STEMI: mortalità a 1 anno	3	66,67			
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	21	19,05			
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni - con nuove variabili	21	19,05			
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	19	21,05			
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	28	32,14			
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	99	8,08	5,93	0,52	0,067
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	108	1,85	1,92	0,52	0,389
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	274	0,37	0,28	0,14	0,052
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	670	1,19	2,04	0,41	0,011
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 90 giorni	621	1,93	2,91	0,34	0
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	2	0			
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 90 giorni	2	50			
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	10	0			
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	32	0			
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	23	0			
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 90 giorni	21	4,76			
Intervento chirurgico per tumore cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	5	0			
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	1	0			



AOUI di VERONA Ospedale di BORGO ROMA (Vr) VENETO					
INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Mortalità a 1 anno nei sopravvissuti a 30 giorni da Infarto Miocardico Acuto complicato da scompenso cardiaco		6	0		
Mortalità a 30 giorni per IMA NSTEMI		14	14,29		
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui (UO coerente)		299	85,95		
Proporzione di PTCA in STEMI su totale PTCA		14	7,14		
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni		1	0		
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	167	6,59	5,23	0,54	0,044
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	139	15,83	15,59	1,21	0,334
STEMI: Mortalità a 30 giorni	2	0			
STEMI: proporzione di PTCA entro 90 minuti sul totale dei trattati con PTCA entro 12h dall'accesso nella struttura di ricovero/service	1	100			
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti dall'accesso nella struttura di ricovero/service	3	33,33			
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	5	0			