



Programma Nazionale Esiti



Dati relativi all'anno 2022 pubblicati da AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Download dal sito <http://pne.agenas.it/>

TREEMAP: Aree cliniche proporzionali ai volumi di attività della STRUTTURA

AOUI di VERONA Ospedale di BORGO TRENTO (Vr) VENETO


Aoui Verona Borgo Trento

Area proporzionale al volume di attività
Dettaglio degli indicatori rappresentativi
dell'area clinica

Volume di attività totale delle aree cliniche in esame
Totale Ospedaliero 22316
Polo Ospedaliero 17743

Molto Basso
Basso
Medio
Alto
Molto Alto
ND

Aoui Verona Borgo Trento





AOUI di VERONA Ospedale di BORGO TRENTO (Vr) VENETO

Aoui Verona Borgo Trento



AREA CLINICA	INDICATORE	N	% Adj	% Italia	Vol. Attività	Vol. Operatore	Audit
CARDIOCIRCOLATORIO	IMA: mortalità a 30 giorni (con variabili cliniche)	371	8.26	7.69	.	.	.
	By-pass Aortocoronario isolato: mortalità a 30 giorni (con variabili cliniche)	352	1.85	2.17	187	34	.
	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti	197	58.06	51.29	.	.	.
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	961	1.24	2.42	.	.	.
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	388	8.40	10.73	.	.	.
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	143	1.53	1.64	.	.	.
NERVOSO	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	427	9.54	10.54	.	.	.
	Intervento chirurgico per T. cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	892	1.83	3.11	.	.	.
RESPIRATORIO	BPCO ricoverata: mortalità a 30 giorni	114	11.66	11.68	.	.	.
CH. GENERALE	Colestectomia laparoscopica: ricoveri con degenza post operatoria < a 3 giorni	170	92.34	82.81	332	45	.
CH. ONCOLOGICA	Nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da chirurgia conservativa per TM mammella	164	6.16	5.60	310	75	.
	Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	205	1.76	4.14	71	45	.
GRAVIDANZA E PARTO	Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	205	1.76	4.14	103	45	.
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	2280	21.54	23.06	2621	113	.
	Proporzione di episiotomie nei parti vaginali	1740	6.18	11.42	2621	113	.
OSTEOMUSCOLARE	Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	302	19.28	10.58	2621	113	.
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore	393	39.25	50.16	457	37	.
	Intervento di protesi di anca: nammissioni a 30 giorni	143	5.55	3.55	215	27	.
NEFROLOGIA	Intervento di protesi di ginocchio: nammissioni a 30 giorni	92	1.08	1.33	134	38	.
	Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	519	5.31	13.04	.	.	.


AOUI di VERONA Ospedale di BORGO ROMA (Vr) VENETO

Aoui Di Verona Borgo Roma



Molto Basso
Basso
Medio
Alto
Molto Alto
ND

Aoui Di Verona Borgo Roma





AOUI di VERONA Ospedale di BORGO ROMA (Vr) VENETO

AouI Di Verona Borgo Roma



AREA CLINICA	INDICATORE	N	% Adj	% Italia	Vol. Attività	Vol. Operatore	Audit
CARDIOCIRCOLATORIO	Scompenso cardiaco congestivo: mortalità a 30 giorni	190	6.10	10.73	.	.	.
NERVOSO	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	82	11.84	10.54	.	.	.
RESPIRATORIO	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	80	18.57	11.68	.	.	.
CH. GENERALE	Colecistectomia laparoscopica: ricoveri con degenza post operatoria < a 3 giorni	175	85.42	82.81	291	44	.
CH. ONCOLOGICA	Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	3	-	0.95	1	1	.
	Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	124	2.35	4.14	75	38	.
NEFROLOGIA	Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	109	10.79	13.04	.	.	.

Standard di qualità

			MOLTO ALTO		ALTO	MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO		
Area clinica	Indicatore	Peso (%)	1	2	3	4	5	Vincolo*	Soglia	
CARDIOCIRCOLATORIO	Infarto Miocardico Acuto: mortalita' a 30 giorni	30	% ≤ 6	6-8	8-12	12-14	> 14			
	Infarto Miocardico Acuto: % trattati con PTCA entro 90 minuti	15	% ≥ 60	50-60	40-50	20-40	< 20			
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalita' a 30 giorni	10	% ≤ 6	6-9	9-14	14-18	> 18			
	By-pass Aortocoronarico: mortalita' a 30 giorni (NV)	20	% ≤ 1.5	1.5-4		> 4		Volume di interventi	180 (media biennio)	
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalita' a 30 giorni	15	% ≤ 1.5	1.5-4		> 4				
	Riparazione di aneurisma non rotto dell' aorta addominale: mortalita' a 30 giorni	10	% ≤ 1	1-3		> 3				
NERVOSO	Ictus ischemico: mortalita' a 30 giorni	75	% ≤ 8	8-10	10-14	14-16	> 16			
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalita' a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	25	% ≤ 1.5	1.5-3.5		3.5-4.5		> 5		
RESPIRATORIO	BPCO riacutizzata: mortalita' a 30 giorni	100	% ≤ 5	5-7	7-12	12-16	> 16			
CH. GENERALE	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 giorni	100	% ≥ 80	70-80	60-70	50-60	< 50	Volume di ricoveri	90	
CH. ONCOLOGICA	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno	34	% ≤ 5	5-8	8-12	12-18	> 18	Volume di ricoveri	135	
	Intervento chirurgico per TM polmone: mortalita' a 30 giorni	33	% ≤ 0.5	0.5-1.3		> 3		Volume di ricoveri	85	
	Intervento chirurgico per TM colon: mortalita' a 30 giorni	33	% ≤ 1	1-3	3-6	6-8	> 8	Volume di ricoveri	45	
GRAVIDANZA E PARTO	Proporzione di parti con taglio cesareo primario (500< vol< 1000)	70	% ≤ 10	10-20	20-30	30-35	> 35	Volume di ricoveri	500	
	% ≤ 20		20-25	25-30	30-35	> 35				
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario (vol≥1000)	15	% ≥ 40	25-40	13-25	5-13	≤ 5			
	Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo		% ≤ 5	5-10	10-15	15-20	> 20			
OSTEOMUSCOLARE	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48h	60	% ≥ 70	60-70	40-60	30-40	< 30	Volume di ricoveri	65	
	Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	20	% ≤ 3	3-9		> 9		Volume di ricoveri	80	
	Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	20	% ≤ 3	3-9		> 9		Volume di ricoveri	80	
NEFROLOGIA	Insufficienza renale cronica: mortalita' a 30 giorni dal ricovero	100	% ≤ 8	8-10	10-20	20-30	> 30	Volume di ricoveri	65	