



DAI di NEUROSCIENZE
UOC Neurologia B – Borgo Roma
RICHIESTA ESAMI SU SIERO E LIQUOR

MU 304250 70-Lab

Rev. 13 del 20/01/2026

ANAGRAFICA PAZIENTE:

COGNOME:

NOME:

SESSO: M ☐ F ☐ Data di nascita

CODICE FISCALE

Istituto e reparto di provenienza

Medico di riferimento:

Telefono:

email

email PEC per spedizione referto

Data del prelievo

Campione: Siero ☐ Liquor ☐

Sospetto clinico _____

Somministrazione di terapia prima del prelievo:

SI ☐ specificare: _____

NO ☐

Breve sintesi della storia clinica

Data

Firma e timbro del medico richiedente

(Per UOC esterne ad AOUI Verona, si raccomanda di allegare sempre Autorizzazione della Direzione Sanitaria)

ESAME RICHIESTO:		
	SIERO	LIQUOR
☐ Conservazione siero per stoccaggio		NO
☐ Anticorpi anti-MAG (myelin associated glycoprotein) – ELISA *		NO
☐ Anticorpi anti-gangliosidi (GM1, GT1a, GD1a, GD1b, GQ1b - IgG ed IgM) – ELISA *		NO
Immunoistochimica su sezioni di encefalo di ratto (specificare): ☐ sensibilizzata per antigeni intracellulari (onconeuronali) ☐ sensibilizzata per antigeni di superficie neuronale/sinaptici (antigeni di superficie) *		
☐ Anticorpi anti-antigeni onconeuronali – line blot (Amfifisina, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu, recoverina, SOX1, titin, GAD65, Zic4, Tr (DNER)) *		
☐ Anticorpi anti-AQP4 – fixed cell-based assay (aquaporin 4) *		NO
☐ Anticorpi anti-MOG – in-house live cell-based assay (myelin oligodendrocyte glycoprotein) *		
☐ Anticorpi anti-IgLON5 – fixed cell based-assay *		
☐ Dosaggio progranulina sierica – ELISA		
☐ Conservazione liquor per stoccaggio	NO	
☐ Isoelettrofocusing per ricerca bande oligoclonali liquorali		
☐ Anticorpi anti-antigeni di superficie – fixed cell-based assay (NMDAR, LGI1, CASPR2, AMPAR1-2, GABA-Br, DPPX-6) *		
☐ Dosaggio proteina TAU – ELISA	NO	
☐ Dosaggio proteine fosfoTAU e amiloide- β 42 – ELISA	NO	
☐		

LEGENDA:

NO: (Non Applicabile)

NOTE:

per gli esami immunologici sono necessari e sufficienti **2 ml di siero e 1 ml di liquor** (quando richiesto);

per il dosaggio della proteina TAU è necessario **1 ml di liquor**;

per il dosaggio delle proteine fosfoTAU e amiloide- β 42 sono necessari **2 ml di liquor**

Preparazione del paziente: preferibile ma non indispensabile il digiuno di 8-12 ore dal pasto.

Per le modalità di invio del campione si rimanda a quanto indicato nell'istruzione IU 15 disponibile sul portale AOUI Verona nella sezione "Documentazione"