



Programma Nazionale Esiti – PNE Edizione 2017

Dati relativi all'anno 2016 pubblicati da AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Download dal sito <http://pne2017.agenas.it/>

INDICATORE – MORTALITA', PROCEDURE etc.

A.O.U.I. - Ospedale Civile Maggiore (VR) VENETO	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (struttura di ricovero)	205	69,76	69,24	0,99	0,847
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	477	6,92	6,16	0,72	0,065
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	640	8,91	8,94	0,86	0,257
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	467	15,85	15,85	1,08	0,492
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	261	35,25	32,5	1,67	0
Parto naturale: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	2733	0,7	0,72	1,39	0,155
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	2733	1,13	1,15	2,02	0
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	181	3,31	3,73	0,92	0,845
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	397	13,1	12,54	1,15	0,326
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	354	5,65	5,92	0,83	0,394
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	133	9,77	9,34	1	0,989
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	468	6,62	5,83	0,74	0,105
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	261	83,14	84,26	1,16	0
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	133	0,75	0,47	0,46	0,458
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	21	4,76	-	-	-
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	107	2,8	2,52	1,05	0,939
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	126	9,52	9,59	0,72	0,231



A.O.U.I. - Ospedale Civile Maggiore (VR) VENETO	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	785	0,89	0,81	1,03	0,935
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	785	1,53	1,5	1,75	0,051
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	14	7,14	-	-	-
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità	197	3,05	2,36	0,61	0,233
Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	16	0	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	16	0	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	16	6,25	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	24	33,33	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	565	6,37	6,57	2,84	0
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità	1101	1,82	2,85	1,05	0,833
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	523	4,59	6,08	0,52	0,002
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	255	8,24	7,97	0,96	0,864
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	123	66,67	75,64	1,57	0
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	435	59,54	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	256	6,25	6,06	0,78	0,316
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	435	95,17	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	565	1,24	1,25	1,14	0,726
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	381	97,9	-	-	-
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità	813	1,35	1,3	0,49	0,019
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	141	18,44	17,9	2,21	0
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	151	15,23	12,4	0,76	0,186
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	1629	16,88	16,73	0,68	0



A.O.U.I. - Ospedale Civile Maggiore (VR) VENETO	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	392	3,83	3,75	0,7	0,176
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	392	79,59	79,23	1,37	0
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	220	4,09	4,12	0,93	0,834
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	154	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	305	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni dall'intervento	112	2,68	2,72	0,8	0,706
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	341	0,29	0,28	0,24	0,149
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	274	3,28	2,91	0,79	0,483
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	262	0,38	0,4	0,23	0,135
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	118	1,69	1,71	1,26	0,742
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	68	4,41	4,76	1,93	0,244
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	49	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	477	46,12	43	0,96	0,482
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	168	1,19	1,54	0,25	0,052
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	221	6,79	6,91	1,68	0,074
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	100	1	1,27	0,71	0,739
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	426	10,8	12,95	1,27	0,124
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	426	17,84	19,81	0,92	0,448
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7 giorni	477	68,34	66,87	1,08	0,027
By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni	527	1,52	1,74	0,81	0,563



A.O.U.I. - Policlinico (VR) VENETO	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (struttura di ricovero)	12	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	40	17,5	-	-	-
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	192	5,73	5,41	0,52	0,03
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	146	12,33	11,94	0,81	0,35
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	104	7,69	6,78	0,35	0,003
Parto naturale: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	1716	0,41	0,38	0,73	0,396
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	1716	0,41	0,39	0,68	0,304
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	76	7,89	6,88	0,63	0,276
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	72	6,94	7,52	1,05	0,901
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	107	15,89	14,84	1,59	0,053
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	35	17,14	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	103	59,22	61,49	0,85	0,039
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	95	1,05	1,94	1,88	0,526
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	603	1,16	2,3	0,48	0,051
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	239	2,51	3,26	1,35	0,457
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	91	16,48	16,22	1,21	0,423
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	962	0,62	0,47	0,61	0,226
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	962	1,77	1,52	1,78	0,018
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	29	3,45	2,89	0,98	0,984
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità	77	2,6	2,6	0,67	0,578
Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	62	3,23	3,38	1,2	0,797
Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	35	2,86	2,86	0,56	0,558
Arteriopatia III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	35	8,57	8,26	0,44	0,143
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	36	2,78	3,12	0,22	0,138



A.O.U.I. - Policlinico (VR) VENETO	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	220	3,64	3,43	1,48	0,264
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità	10	0	-	-	-
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	64	10,94	10,56	0,91	0,8
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	1	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	1	100	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	1	0	-	-	-
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	1	0	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	220	0,91	0,8	0,73	0,657
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	157	95,54	-	-	-
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità	4	0	-	-	-
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	221	12,22	10,6	1,31	0,18
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	29	20,69	-	-	-
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	1068	26,59	23,75	0,97	0,647
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	2	0	-	-	-
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	2	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	3	0	-	-	-
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	57	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	12	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni dall'intervento	8	12,5	-	-	-
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	92	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	40	7,5	-	-	-
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	33	6,06	-	-	-
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	114	4,39	6,12	1,49	0,398



A.O.U.I. - Policlinico (VR) VENETO	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	25	4	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	62	14,52	8,16	0,8	0,554
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	62	19,35	16,7	0,78	0,366
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7 giorni	40	27,5	-	-	-
By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni	12	8,33	-	-	-